

# Rejsediaré

## Mild

1-2 aff. pr. dag  
Ingen blod  
Ingen feber

## Moderat

>3 aff. pr. 8 timer  
Ingen blod  
Ingen feber

## Svær

Blod i afføring  
eller  
Feber (dvs. > 38 i temp.)

Rigelig væske  
Imodium

Rigelig væske  
Imodium  
Azithromycin 1000 mg.  
som éngangsdosis

Azithromycin 500 mg. 2  
gange dagligt  
Lægehjælp mulig?

Symptomfri  
efter 12 timer

Ikke symptomfri

Symptomfri  
efter 12 timer

Ikke symptomfri

Ja

Nej

Rigelig væske  
Stop  
Imodium

Rigelig væske  
Imodium  
Azithromycin 1000 mg. som éngangsdosis

Rigelig væske  
Stop  
Imodium

Azithromycin 500 mg. 2  
gange dagligt i 3 dage

Søg læge!

Rigelig væske  
Fortsæt med Azithromycin  
500 mg. gange 2 dagligt  
IKKE Imodium

Symptomfri  
efter 12 timer

Ikke symptomfri

Symptomfri  
efter 72 timer

Ikke  
symptomfri

Høj feber og blod i afføringen  
efter ét døgn's behandling?

Rigelig væske  
Stop  
Imodium

Azithromycin 500 mg. 2  
gange dagligt i 3 dage

Rigelig væske  
Stop  
Imodium

Søg læge!

Ja

Nej

Symptomfri  
efter 72 timer

Ikke  
symptomfri

Søg læge!

Fortsæt med  
Azithromycin  
500 mg.  
gange 2  
dagligt i  
minimum 3  
dage  
Rigelig væske

Rigelig væske  
Stop  
Imodium

Søg læge!



Lægerne  
Baandrup & Secher